

**ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ**

**Општинско такмичење из математике  
ученика основних школа  
20.02.2022.**

**VIII разред**

1. Тачке  $A$  и  $B$  налазе се са разних страна равни  $\alpha$ . Тачка  $A$  је од равни  $\alpha$  удаљена 4 cm. Тачка  $B$  је од равни  $\alpha$  удаљена 8 cm. Израчунај дужину дужи  $AB$ , ако је дужина њене ортогоналне пројекције на раван  $\alpha$  једнака 9 cm.
2. У равни је дато 8 тачака, међу којима су тачно четири тројке колинеарних тачака. Колико правих одређују ове тачке?
3. Одреди реалан број  $a$  тако да једначине
$$x \cdot \left(2a - \frac{2}{3}\right) = a - \frac{x}{3} + 4 \quad \text{и} \quad \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right) = x - \frac{x+1}{2}$$
буду еквивалентне.
4. Одреди збир свих решења једначине
$$\left| |x - \sqrt{5}| - \sqrt{2} \right| = \sqrt{5}.$$
5. У троугао  $ABC$  је уписан круг. Тангента тог круга паралелна са страницом  $AB$  сече странице  $BC$  и  $AC$  у тачкама  $M$  и  $N$ . Одреди дужину дужи  $MN$  ако су дужине страница троугла  $ABC$ :  $AB = 14\text{cm}$ ,  $BC = 13\text{cm}$  и  $CA = 15\text{cm}$ .

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.

Израда задатака траје 120 минута.


Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

VIII РАЗРЕД

Признавати сваки тачан поступак који се разликује од кључа.  
Бодовање прилагодити конкретном начину решавања.

1. (МЛ 55/2) Означимо ортогоналне пројекције тачака  $A$  и  $B$  на раван  $\alpha$  са  $A'$  и  $B'$ , редом. Нека је  $C$  тачка праве  $BB'$  таква да је  $BC = 4$  cm и  $A'CBA$  је паралелограм. Тада је  $AB = AC'$  [10 бодова]. Применом Питагорине теореме налазимо

$$A'C = \sqrt{A'B'^2 + B'C^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ cm} \text{ [10 бодова].}$$



2. (МЛ 55/2) Када не би постојала ни једна тројка колинеарних тачака, број правих које одређују 8 тачака би био  $(8 \cdot 7) : 2 = 28$  [5 бодова]. Овај број треба умањити за  $4 \cdot 2 = 8$  јер свака од 4 тројки колинеарних тачака одређује једну, а не три праве [10 бодова]. Дакле, тражени број правих је  $28 - 8 = 20$  [5 бодова].

3. Решење једначине  $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - x\right) = x - \frac{x+1}{2}$  је број  $\frac{3}{4}$  [6 бодова], па ће једначине да буду еквивалентне ако је  $\frac{3}{4} \cdot \left(2a - \frac{2}{3}\right) = a - \frac{1}{4} + 4$  [8

бодова], одакле се добија  $a = \frac{17}{2}$  [6 бодова].

4. Добија се  $|x - \sqrt{5}| - \sqrt{2} = \sqrt{5}$  или  $|x - \sqrt{5}| - \sqrt{2} = -\sqrt{5}$  [5 бодова]. У првом случају је  $|x - \sqrt{5}| = \sqrt{2} + \sqrt{5}$  одакле је  $x - \sqrt{5} = \sqrt{2} + \sqrt{5}$  или  $x - \sqrt{5} = -\sqrt{2} - \sqrt{5}$ , тј.  $x = \sqrt{2} + 2\sqrt{5}$  или  $x = -\sqrt{2}$  [8 бодова]. У другом случају је  $|x - \sqrt{5}| = \sqrt{2} - \sqrt{5} < 0$ , па у овом случају нема решења [5 бодова]. Дакле, једначина има два решења:  $x_1 = \sqrt{2} + 2\sqrt{5}$  и  $x_2 = -\sqrt{2}$ . Тражени збир је  $\sqrt{2} + 2\sqrt{5} - \sqrt{2} = 2\sqrt{5}$  [2 бодова].

5. Користећи Херонов образац (или на неки други начин), добијамо да је површина троугла  $ABC$  једнака  $84 \text{ cm}^2$  [4 бода]. Висину  $CD$  троугла  $ABC$ , која одговара страници  $AB$ , добијамо из површине троугла  $CD = \frac{2P}{AB} = 12 \text{ cm}$  [4 бода]. Означимо полупречник уписаног круга са  $r$ . Како је површина троугла  $ABC$  једнака  $P = \frac{AB \cdot r}{2} + \frac{BC \cdot r}{2} + \frac{AC \cdot r}{2}$  добијамо да је  $r = 4 \text{ cm}$  [4 бода]. Сада је висина  $CE$  троугла  $NMC$  једнака  $CE = CD - DE = CD - 2r = 4 \text{ cm}$  [4 бода]. Из сличности троуглова  $ABC$  и  $NMC$  имамо да је  $AB : NM = CD : CE$ , одакле је  $NM = \frac{14}{3} \text{ cm}$  [4 бода].

